

سىيە سۆى (PCP) Pneumocystis Carinii Pneumonia

يەككە لەگىنگىرىن و ناسراوترىن سىيە سۆكان بەھۆى كەروەھە پىشتر وا دەزانرا بەھۆى پىرۇتوزورىكى بچوكەھە دەبىت كە لەنىوان 1-2 ماىكرۇندايەھە لەقۇناخىكى درەنگدا تووشى ئەيدىزدار دەبىت زىاتر كورتكراھەى PCP ى بۇ بەكاردەھىنرىت. لەسالى 1909 دا (ھاگاس) لەبەرازىل توانى ھۆى ئەم جۆرە سۆيە لە سۆيەكانى تر جىياكتەھە، ھەرچەندە پىيى واپو كەئەم پىرۇتوزورە ترىپانۇسۆمىياھە.

لەسالى 1950 سۆكە باشتر لەجىھاندا ناسىنراھە، لەسالى 1981 لەئەمىرىكا بەتپىروتەسەلى لەسەر سۆكە نووسراھە چونكە تا ئەھە وادەزانرا تەنبا تووشى مندال دەبىت، بەلام لەم 20 سالانەى دوواىدا لەزۆرىھەى و لاتە پىشەسازىيەكاندا زىاتر تووشى ئەيدىزدار دەبىت.

پەتازانى

نازانرىت تا ئەمىرۇ ئەم جۆرە سۆيە لەجىھاندا چەند بىلەھە، بەلام سۆكە لەھەموو جىھاندا بىلەھە. بىچارەكردن نىزىكەى لە 80-85% ئەيدىزداران ئەم جۆرە سۆيەيان تىدا گەشەدەكات. ئەھەى شايانى باسە لەئامارە جىياكاندا پىشانراھە لە 25% ئەيدىزدارە ئەمەرىكايىھەكان و لە 14% ئەيدىزدارە ئەورۇپايىھەكان بەھۆى PCP ھەھە دەمرن. (لەسالى 1995-1996 ھەھە تا ئەمىرۇ ئەھە رىژەھە لەناو ئەيدىزدارە ئەمەرىكايىھەكاندا نىمبووھەتەھە). زۆرجار سۆكە بە دەگمەن دەرەھەى سىيەكان ھەك لىمفە گىرۇكان، سىل، جگەر، مۇخى ئىسك يان پىست دەگىرئەھە.

پىگى گواستەھە

لەپىگى ھەواھە پاراسايتەكە دەكاتە نىو سىيەكان.

درمى سۆكە

بەتايبەتى لەناو مندالدا زۆر بەرزە.

نىشانەكان

ماھەى كىرەكتى پاراسايتەكە لەنىوان 3-4 ھەفتەداھە. بىئەھەى نەخۇش تىبىنى بكات نىشانەكانى دەرەكەون. شىھەى سۆكە ھەك سۆيەكى ناسايى سىيەكانە. لەسەرەتادا نەخۇش وشكە كۆكەيەكى ھەيە، كەمىك تاي لىدىت و كەمىكىش ھەناسەى سوار دەبىت. نىشانەيەكى ناسايى سۆكە برىتییە لەژانەسنگ لەكاتى كۆكىندا. پاشتر نەخۇش ئارەزوى خواردىنى نامىنىت، كىشى لەش كەمدەبىتەھە، شەوانە ئارەقە دەكاتەھە، بىھىزى و بىخولقىش دەبىنرىت. ھىدى ھىدى كۆكەكە لەماھەى 6-8 ھەفتە تەر دەبىت.

لە تىپوانىندا دەرەكەرىت

ژمارەى ھەناسەدان و لىدانى دل زىادبووھە، ھەناسە ھەرگىرتنى قول نەخۇش تووشى كۆكە دەكات، ھاوكات نەخۇش تادارە. ھەندىكجار لەبارە توندەكاندا پووخسارى نەخۇش شىن ھەلدەگەرىت، ھۆكەشى دەگەرىتەھە بۇكەمبوونەھەى نۇكسجىنى ناوخوین!!

لە ئىكسبەردارى سنگ دا

- لە 5-10% وىنەكان ناسايىھە.

- لە 10% تىدا چەند بلىقىكى ھەوايى بەدەدەكرىت.

- لە 2-9% تى تووشبووان pneumotorax يان تىادا بەدەدەكرىت.

گەر ئەيدىزدارىك تووشى ئەم سۆيە نەبووىت ئەوا مەترسىيە pneumotorax ى كەمتر لىدەكرىت.

دەستنیشانکردن

ئەمپۇ دەتوانىن راستەوخۇ پنىۆمۆسىست لە گرویسكى نەخۆشدا جیا بکەينەوه و دەستنیشان بکەين.

چارەسەرکردن

باشترین چارەسەرکردنى ئەم سۆيە بەدوو دەرمانى سەرەكى دەكریٲ كە ئەمانەن:

پىووستە پۇژانە 15 ملگم/ كگم Trimethoprim و 75 ملگم/ كگم Sulphamethoxazole لە دەمەوه يان بەخوینھينەردا بدریٲ بەنەخۆش.

ئەو كەسانەى ھەستدارن لەو دەرمانانەى سەرەوه پىووستە 3-4 گم/كگم Pentamidine پۇژانە بەخوینھينەردا يان 600 ملگم Clindamycin لەنيوان 6-8 كازيٲردا بەن لەخوینھينەرى نەخۆش.

تیبينى: زۇرچار ئەو كەسانەى تووشى ئەم سۆيە دەبن ژمارەى CD4 يان نزم دەبيٲتەوه بەپۇژەيەك تا دەگاتە ژيٲر 200 خانەوه.

سەرچارەكان

1- د . زاھير سوران ، نەخۆشبيە دەرمانەكان ، بەشى يازدە ، چاپى يەكەم ، سلیمانى – كوردستان ، 2004 .

References

1. Iwarson-Norrby, infektionsmedicin, epidemiologi, klinik och terapi, Söve Frlag 1998, Stockholm.
2. Marin GH. Voiculescu: Infectious Diseases, vol 2. Medical Edition; 1990; 112-134.
3. Gottlieb MS, et al: Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency, N Engl J med 1981; 305: 1425.